



Delta®

# Argivo® Se

Aliment complémentaire minéral pour ruminants

## Caractéristiques

- Distribution facile en libre service
- Aromatisation spécifique jeunes ruminants pour une ingestion régulière et spontanée.
- Facilite le démarrage et la digestion du lait.

## Composition

- Sorbitol, sucre, caroubes, métabolites de levures, sel.

## Constituants analytiques

- |                                     |        |                   |       |
|-------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| • Cendres insolubles dans HCl ..... | 45,9 % | • Phosphore ..... | 0,1 % |
| • Calcium .....                     | 1,4 %  | • Sodium .....    | 1,2 % |
|                                     |        | • Magnésium ..... | 1 %   |

## Additifs au kg

### • Vitamines

3a700 Vitamine E (acétate d'alpha tocophéryle tot. Racémique) ..... 2 000 mg

### • Liants

1m558i Bentonite ..... 500 000 mg  
E559 Argile kaolinitique exempte d'amiante ..... 143 600 mg

### • Gélifiants

E412 Gomme de guar ..... 30 000 mg

### • Oligo-éléments

3b202 Iode (iodate de calcium anhydre) ..... 100 mg  
3b801 Sélénium (sélénite de sodium) ..... 8,5 mg  
3b8.12 Sélénium (sélénométhionine CNCM I-3399) ..... 1,5 mg

### • Substances aromatiques

Mélange de substances aromatiques

## Mode d'emploi

- Mettre à disposition des animaux dès le jour de la naissance, ARGIVO SE peut être distribué à **volonté**, les quantités ingérées à prévoir dans un premier temps sont de l'ordre de :
- **Veaux d'élevage (moins d'un an)** : 50 g par jour au bout des 4 premières semaines.
- **Veaux d'élevage au sevrage** : 80 g par jour pendant 7 jours
- **Agneaux / chevreaux** : 20 g par jour au bout de 10 jours
- **Allotement des veaux, agneaux et chevreaux** : 10 g par jour pour 25 kg de poids vif pendant 5 à 10 jours
- **A la mise à l'herbe (adultes)** : 150 g / jour. Commencer une semaine avant et poursuivre une semaine après.

## Recommandations

- Limiter l'emploi aux seules espèces destinataires.
- L'utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée
- Une teneur en cuivre inférieure à 20 mg par kg de la ration journalière totale peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.
- Respecter le mode d'emploi.
- Il convient de demander l'avis d'un expert en nutrition animale avant d'utiliser ou de prolonger l'utilisation de cet aliment.

## Conservation

- 18 mois à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

**DELTAVIT**   
GROUPE CCPA

Poudre  
Sac de 15 kg