


LAPIN

Lapin standard

L603



Composition

Remoulage, Tourteau de pression de tournesol, Orge, Luzerne, Paille, Tourteau d'extraction de colza, Mélasse de canne à sucre, Caroube, Minéraux et Vitamines, Carbonate de calcium, Sel de mer.

CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES

OLIGO-ELEMENTS ET VITAMINES

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| EML | 2 249 kcal | Calcium | 1.0 % | Zinc | 100 mg/kg | Cobalt | 0.3 mg/kg |
| Protéine Brute | 16.3 % | Sodium | 0.2 % | Fer | 40 mg/kg | Sélénium | 0.05 mg/kg |
| Matière Grasse | 3.0 % | Phosphore | 0.7 % | Manganèse | 20 mg/kg | Vitamine A | 7 500 UI/kg |
| Cellulose Brute | 15.4 % | | | Cuivre | 4 mg/kg | Vitamine D3 | 1 000 UI/kg |
| Cendres Brutes | 7.8 % | | | Iode | 0.5 mg/kg | Vitamine E | 15 UI/kg |

Utilisation

Aliment à distribuer à volonté aux lapines allaitantes et en dernière semaine de gestation. Rationner les futures reproductrices et les lapines non allaitantes, en attente ou pendant leurs trois premières semaines de gestation à raison de 155g/jour pour éviter un engraissement excessif préjudiciable à leur santé.

Pour plus de sécurité digestive, rationner les lapins en engraissement à raison de 70g/jour au sevrage (pour un lapereau de 1kg). La ration quotidienne sera distribuée de préférence en fin d'après-midi pour respecter le comportement naturel du lapin. Augmenter la ration de 10g tous les 3 à 4 jours.

Tenir à disposition de l'eau fraîche en permanence (consommation culminant à 2 litres par jour pour une lapine et sa portée et estimée à 2 fois la consommation d'aliment en engraissement).



BERMOND NUTRITION

256 Chemin des bois - 30730 SAINT-BAUZELY

Tél : 04 66 81 79 18 / Fax : 04 66 81 78 62

www.bermondnutrition.com

Siret : 420 312 019 00029 - N°ID FR 89420312019 - Capital 1 016 145 € - APE 1091Z - FR 30 233 002

